



GEBRAUCHSINFORMATION
Canidryl 100 mg Tabletten für Hunde

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea, Co. Galway, Ireland

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS
Canidryl 100 mg Tabletten für Hunde
Carprofen

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 Tablette mit Grillfleischaroma enthält:
Carprofen 100,0 mg/Tablette
Weiße bis cremefarbene runde Tablette mit
Kreuzbruchrille auf einer Seite.
Die Tabletten lassen sich in zwei gleiche
Hälften oder vier gleiche Stücke teilen.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung von entzündlichen
und schmerzhaften Erkrankungen des
Bewegungsapparates sowie bei degenerativen
Gelenkerkrankungen.
Zur Schmerzbehandlung nach operativen
Eingriffen.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht bei Katzen anwenden.
Nicht bei Welpen, die jünger als 4 Monate sind,
anwenden.
Nicht anwenden bei bekannter
Überempfindlichkeit gegenüber dem
arzneilich wirksamen Bestandteil oder der
einem der sonstigen Bestandteile.
Nicht anwenden bei Hunden, die an Herz-,
Leber- oder Nierenerkrankungen leiden, oder
bei Verdacht auf Magen-Darmgeschwüre, bei
Blutungsneigung oder bei Abweichungen im
Blutbild.

6. NEBENWIRKUNGEN

Magen-Darm-Störungen (Erbrechen, weicher
Stuhlgang/Durchfall, Appetitlosigkeit),
Magen-Darm-Blutungen (erkennbar an der
Farbveränderung des Kotes) sowie
teilnahmsloses Verhalten.

Diese Nebenwirkungsreaktionen treten
generell innerhalb der ersten
Behandlungswoche auf, sind in den meisten
Fällen vorübergehend und verschwinden
nach Beendigung der Behandlung, können
aber in sehr seltenen Fällen ernsthaft oder
sogar tödlich sein.

Bei Auftreten der beschriebenen, typischen
Nebenwirkungen ist die Behandlung
abzubrechen und mit dem Tier umgehend
einen Tierarzt aufzusuchen.

Es besteht auch das Risiko einer seltenen,
Nieren- oder Leberüberempfindlichkeitsreaktion.
Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere
solche, die nicht in der Packungsbeilage
aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen,
teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)
Hund

**8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND
DAUER DER ANWENDUNG**
Zum Eingeben.

Täglich 4 mg Carprofen pro kg Körpergewicht.
Diese Initial-Tagesdosis kann auch auf zwei
Teilmengen aufgeteilt werden.

Bei sichtbarer Besserung kann die Dosis nach
Angaben des Tierarztes reduziert werden.
Die Behandlungsdauer richtet sich nach dem
klinischen Verlauf der Erkrankung.
Eine Langzeitbehandlung sollte nur in
Begleitung einer regelmäßigen tierärztlichen
Überwachung erfolgen.

Nach chirurgischen Eingriffen kann die
schmerzstillende und entzündungshemmende
Wirkung einer Carprofen-Injektion mit
Carprofen Tabletten in einer Dosierung von
4 mg/kg/Tag bis zu 5 Tage verlängert werden.
Die angegebene Dosierung sollte nicht
überschritten werden.

**9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE
ANWENDUNG**

Noch nicht verabreichte geteilte Tabletten
sollten in den Blister oder Behälter
zurückgelegt und innerhalb von 72 Stunden
verwendet werden. Die Tablettenstücke
sollten bei der folgenden Dosis verabreicht
werden.

Nicht verwendete geteilte Tabletten sind nach
der letzten Dosis zu entsorgen.

10. WARTEZEIT
Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder
aufbewahren.

Trocken und vor Licht geschützt in der
Originalverpackung aufbewahren.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf
dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht
mehr anwenden.

Noch nicht verabreichte geteilte Tabletten
sollten in den Blister oder Behälter
zurückgelegt und innerhalb von 72 Stunden
verwendet werden. Die Tablettenstücke sollten
bei der folgenden Dosis verabreicht werden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Nicht bei trächtigen oder laktierenden
Hündinnen anwenden.

Die Anwendung bei alten Hunden kann zu
einem zusätzlichen Risiko führen. Sollte eine
Behandlung notwendig sein, erfordert dies eine
sorgfältige Überwachung durch den Tierarzt.
Auf Grund eines erhöhten potentiellen
Risikos einer Nierenschädigung sollte die
Anwendung bei Hunden mit zu geringer
Aufnahme bzw. zu hohen Verlusten an
Flüssigkeit, bei zu geringem Blutvolumen oder
zu niedrigem Blutdruck, vermieden werden.
Nicht gleichzeitig mit anderen potentiell
nierenschädigenden Arzneimitteln verabreichen.
Carprofen kann die zelleigenen
Abwehrmechanismen hemmen, daher ist bei
der Behandlung von entzündlichen Zuständen,
die mit einer bakteriellen Infektion verbunden
sind, gleichzeitig eine entsprechende
antimikrobielle Behandlung durchzuführen.
Nicht gleichzeitig bzw. innerhalb von 24
Stunden mit anderen NSAIDs anwenden.
Nicht gleichzeitig mit Substanzen anwenden,
die ebenfalls eine hohe Plasma-Eiweiß-
Bindung haben.
Nicht gleichzeitig mit Glukokortikoiden
anwenden.
Bei versehentlicher Überdosierung ist
durch den Tierarzt eine den Symptomen
entsprechende Therapie durchzuführen, da es
kein spezifisches Gegenmittel gibt.

Für den Anwender:

Bei versehentlicher Einnahme der Tabletten,
ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen
und die Packungsbeilage oder das Etikett
vorzuzeigen.

Nach Anwendung Hände waschen!

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN
FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT
VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER
VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN
ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder
davon stammende Abfallmaterialien sind
entsprechend den nationalen Vorschriften zu
entsorgen.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER
PACKUNGSBEILAGE**
Dezember 2023

15. WEITERE ANGABEN
Z. Nr.: 8-000683

Packungsgrößen:

Packungsgrößen für Blisterpackungen:
6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 98,
100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500 und 1000
Tabletten.

Packungsgrößen für Dosen:

100 mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84,
98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300

Es werden möglicherweise nicht alle
Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Falls weitere Informationen über das
Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen
Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des
Zulassungsinhabers in Verbindung:

VetViva Richter GmbH
Durisolstrasse 14
4600 Wels, Österreich

Zusätzliche Information:

Carprofen gehört zur Gruppe der
sogenannten nicht steroidal,
entzündungshemmenden Arzneimittel
(NSAID). Es hat entzündungshemmende,
schmerzstillende und fiebersenkende
Eigenschaften.

Design Information	
Size	258 x 156 mm
Text page 1	8 pt
Font Type	Myriad Pro, Akzidenz-Grotesk Pro
Colours used	Pantone Black 6 C 
Packaging No.	LB14660 50045023BPT/04.2023/C
PDF Version	1.6
Approval date + signature	